

Formale Modellierung

Vorlesung 9 vom 12.06.14: Die Unvollständigkeitssätze von Gödel

Serge Autexier & Christoph Lüth

Universität Bremen

Sommersemester 2014

Fahrplan

- ▶ Teil I: Formale Logik
 - ▶ Einführung
 - ▶ Aussagenlogik: Syntax und Semantik, Natürliches Schließen
 - ▶ Konsistenz & Vollständigkeit der Aussagenlogik
 - ▶ Prädikatenlogik (FOL): Syntax und Semantik
 - ▶ Konsistenz & Vollständigkeit von FOL
 - ▶ Beschreibungslogiken
 - ▶ FOL mit induktiven Datentypen
 - ▶ FOL mit Induktion und Rekursion
 - ▶ Die Unvollständigkeitssätze von Gödel
- ▶ Teil II: Spezifikation und Verifikation

Das Tagesmenü

- ▶ Gödels erster Unvollständigkeitssatz

Jede konsistente Theorie, die hinreichend expressiv ist, um die natürlichen Zahlen zu Formalisieren erlaubt die Formulierung von wahren Aussagen, die weder beweisbar noch widerlegbar sind.

Gödels erster Unvollständigkeitssatz

Jede konsistente Theorie, die hinreichend expressiv ist, um die natürlichen Zahlen zu formalisieren erlaubt die Formulierung von wahren Aussagen, die weder beweisbar noch widerlegbar sind.

- ▶ Zu jeder Formel φ gibt es eine natürliche Zahl, die diese Formel eindeutig kodiert $[\varphi]$
- ▶ Zu jedem ND-Beweis D für φ gibt es eine natürliche Zahl, die diesen Beweis eindeutig kodiert $[D]$
- ▶ Beweisbarkeit von φ in \mathbb{N} ist als Prädikat $\text{Provable}([\varphi])$ formalisierbar in \mathbb{N}
- ▶ Konstruktion einer Formel mit Aussage “Ich bin nicht beweisbar”
 $\varphi \longleftrightarrow \neg \text{Prov}([\varphi])$

Gödel Kodierung

Folgende Funktion ist definierbar in PA:

$$(n, m) = 2^n \times 3^m$$

Eigenschaften: Es gibt eindeutige Projektionen

$$\text{Left}((n, m)) = n \quad \text{Right}((n, m)) = m$$

Gödel Kodierung für Terme

Signatur $\Sigma = (\mathcal{F}, \mathcal{P})$, Variables X

- ▶ Variablen $x_1, x_2, \dots \in X$

$$\lceil x_i \rceil := (0, i)$$

- ▶ Funktionen $f_1, \dots \in \mathcal{F}$

$$\lceil f_i \rceil := (1, i)$$

- ▶ Terme

$$\lceil f_i(t_1, \dots, t_n) \rceil := \langle \lceil f_i \rceil, \lceil t_1 \rceil, \dots, \lceil t_n \rceil \rangle$$

wobei

$$\langle n_1, \dots, n_k \rangle := \begin{cases} n_1 & \text{if } k = 1 \\ (n_1, \langle n_2, \dots, n_k \rangle) & \text{if } k > 1 \end{cases}$$

Gödel Kodierung für Formeln

Signatur $\Sigma = (\mathcal{F}, \mathcal{P})$, Variables X

- ▶ Prädikate $p_1, \dots \in \mathcal{P}$, $\perp := p_1$, $\dot{=} := p_2$

$$\lceil p_i \rceil := (2, i)$$

- ▶ Atome

$$\lceil p_i(t_1, \dots, t_n) \rceil := \langle \lceil p_i \rceil, \lceil t_1 \rceil, \dots, \lceil t_n \rceil \rangle$$

- ▶ Konnektive und Quantoren

$$\lceil \neg \rceil = (3, 1), \lceil \wedge \rceil = (3, 2), \lceil \vee \rceil = (3, 3)$$

$$\lceil \longrightarrow \rceil = (3, 4), \lceil \longleftrightarrow \rceil = (3, 5), \lceil \forall \rceil = (3, 6), \lceil \exists \rceil = (3, 7)$$

Gödel Kodierung für Formeln II

Signatur $\Sigma = (\mathcal{F}, \mathcal{P})$, Variables X

- ▶ $\lceil \neg \varphi \rceil = (\lceil \neg \rceil, \lceil \varphi \rceil)$
- ▶ $\lceil \psi \circ \varphi \rceil = \langle \lceil \circ \rceil, \lceil \psi \rceil, \lceil \varphi \rceil \rangle$
- ▶ $\lceil Qx_i.\varphi \rceil = \langle \lceil Q \rceil, \lceil x_i \rceil, \lceil \varphi \rceil \rangle$

Lemma 1 (Facts)

- ▶ Sei $G := \{ \lceil \varphi \rceil \mid \varphi \text{ Variable, Term, oder Formel} \}$
- ▶ G ist entscheidbar
- ▶ $\lceil n \rceil = \varphi \Leftrightarrow \lceil \varphi \rceil = n$ ist eindeutig definiert auf G
- ▶ Substitutionsfunktion $\text{subst}(n, x, t) = m$ definierbar auf G

$$\lceil \varphi[t/x] \rceil = \text{subst}(\lceil \varphi \rceil, \lceil x \rceil, \lceil t \rceil)$$

Gödel Kodierung für Ableitungen

- ▶ Gödel Kodierung für Hypothesen Liste:

$$\begin{aligned} \llbracket [\varphi_1, \dots, \varphi_n] \rrbracket &= \begin{cases} 1 & \text{if } n = 0 \\ \langle (4, \llbracket \varphi_1 \rrbracket), \dots, (4, \llbracket \varphi_n \rrbracket) \rangle & \text{if } n > 0 \end{cases} \\ n \in h &\Leftrightarrow \begin{cases} \perp & \text{if } h = 1 \\ \top & \text{if } h = (4, n) \vee \exists m. h = ((4, n), m) \\ n \in m & \text{if } \exists q, m. \neg(q = n) \wedge h = ((4, q), m) \end{cases} \end{aligned}$$

- ▶ Definition von **Konkatenation** * und **Streichen** von Hypothesen

Gödel Kodierung für Ableitungen

$$\left[\frac{D_1 \quad D_2}{\phi \quad \psi} \wedge I \right] = \langle (5, [\wedge]), \left[\frac{D_1}{\phi} \right], \left[\frac{D_2}{\psi} \right], [\phi \wedge \psi] \rangle$$

$$\left[\frac{D}{\phi \wedge \psi} \wedge E_L \right] = \langle (6, [\wedge]), \left[\frac{D}{\phi \wedge \psi} \right], [\phi] \rangle$$

Gödel Kodierung für Ableitungen

$$\left[\frac{D \quad \psi}{\phi \longrightarrow \psi} \longrightarrow I \right] = \langle (5, [\longrightarrow]), \left[\begin{array}{c} D \\ \psi \end{array} \right], [\phi \longrightarrow \psi] \rangle$$

$$\left[\frac{D_1 \quad \phi \xrightarrow{D_2} \psi}{\psi} \longrightarrow E \right] = \langle (6, [\longrightarrow]), \left[\begin{array}{c} D_1 \\ \phi \end{array} \right], \left[\phi \xrightarrow{D_2} \psi \right], [\psi] \rangle$$

Gödel Kodierung für Ableitungen

- ▶ Basisfall: $\ulcorner \phi \urcorner := \langle (4, \ulcorner \phi \urcorner) \rangle$
- ▶ Entsprechend für RAA, $\forall I$, $\forall E$
- ▶ Definiere $\text{Der}(p, h, z)$: $\ulcorner p \urcorner$ ist Beweis für $\ulcorner z \urcorner$ aus Hypothesen $\ulcorner h \urcorner$

$\text{Der}(p, h, z) := (4, z) \in h$	Hypothese
$\vee \exists p_1, h_1, z_1, p_2, h_2, z_2.$	$\wedge I$
$\text{Der}(p_1, h_1, z_1) \wedge \text{Der}(p_2, h_2, z_2) \wedge$	
$h = h_1 * h_2 \wedge$	
$p = \langle (5, \ulcorner \wedge \urcorner), p_1, p_2, \ulcorner \ulcorner z_1 \urcorner \wedge \ulcorner z_2 \urcorner \urcorner \rangle$	
$\vee \exists p_1, h_1, z_1, u.$	$\longrightarrow I$
$\text{Der}(p_1, h_1, z_1) \wedge$	
$h = \text{Streiche}(u, h_1) \wedge$	
$p = \langle (5, \ulcorner \longrightarrow \urcorner), p_1, \ulcorner \ulcorner u \urcorner \longrightarrow \ulcorner z_2 \urcorner \urcorner \rangle$	
...	

Beweisbarkeit

- ▶ Peano-Axiome + Erweiterung: PA Sei $Ax : \mathbb{N}$ Prädikat

$$Ax(n) \longleftrightarrow \bigvee_{\varphi \in PA} n = \lceil \varphi \rceil$$

- ▶ $\text{Prov}(p, f)$: p is Gödelnummer eines ND-Beweis für $\lceil f \rceil$

$$\text{Prov}(p, f) \Leftrightarrow \exists h. (\text{Der}(p, h, z) \wedge \forall g. g \in h \wedge Ax(g))$$

- ▶ $\text{Thm}(f)$: $\lceil f \rceil$ ist ein PA Theorem

$$\text{Thm}(f) \longleftrightarrow \exists p. \text{Prov}(p, f)$$

Fixpoint Theorem

Theorem 2 (Fixpoint Theorem)

For each formula $\varphi(x)$ with only one free variable x there exists a formula ψ such that $\vdash \varphi(\ulcorner \psi \urcorner) \longleftrightarrow \psi$

Gödel's erster Unvollständigkeitssatz

Jede konsistente Theorie, die hinreichend expressiv ist, um die natürlichen Zahlen zu Formalisieren erlaubt die Formulierung von wahren Aussagen, die weder beweisbar noch widerlegbar sind.

$$\text{Thm}(f) \longleftrightarrow \exists p. \text{Prov}(p, f)$$

existiert φ so dass $\vdash \varphi \longleftrightarrow \neg \text{Thm}(\ulcorner \varphi \urcorner)$ (Fixpoint auf $\neg \text{Thm}(f)$)

φ bedeutet: "Ich bin nicht beweisbar"

► Es gilt $\mathbb{N} \models \varphi \longleftrightarrow \neg \text{Thm}(\ulcorner \varphi \urcorner)$

► Annahme $\mathbb{N} \models \text{Thm}(\ulcorner \varphi \urcorner)$

$$\Leftrightarrow \mathbb{N} \models \exists x. \text{Prov}(x, \ulcorner \varphi \urcorner)$$

$$\Leftrightarrow \mathbb{N} \models \text{Prov}(n, \ulcorner \varphi \urcorner) \text{ for some } n$$

$$\Leftrightarrow \vdash \text{Prov}(n, \ulcorner \varphi \urcorner) \text{ for some } n$$

$$\Leftrightarrow \vdash \varphi$$

$$\Rightarrow \vdash \neg \text{Thm}(\ulcorner \varphi \urcorner)$$

$$\Rightarrow \mathbb{N} \models \neg \text{Thm}(\ulcorner \varphi \urcorner)$$

► Contradiction, hence φ is true in \mathbb{N} , but not provable

Zusammenfassung

- ▶ Terminierende Funktionen und abgeleitete Induktionsschemata
 - ▶ Hilfreich bei Induktion über Variablen in Argumenten von terminierenden Funktionen um Rekursionsgleichungen anwendbar zu machen
- ▶ Gödels erster Unvollständigkeitssatz

Jede konsistente Theorie, die hinreichend expressiv ist, um die natürlichen Zahlen zu Formalisieren erlaubt die Formulierung von wahren Aussagen, die weder beweisbar noch widerlegbar sind.
- ▶ Beweis durch Kodierung von Formeln und Ableitbarkeit in Peano-Arithmetik
- ▶ Reflektion der Beweisbarkeit in einer Formel
- ▶ Konstruktion einer Formel mit der Aussage “Ich bin nicht beweisbar”